



POUR PLUS D'INFORMATIONS



OPTIONS

POUR LA SANTÉ SEXUELLE

1-800-739-7367

LIGNE "SEX SENSE"


1-800-739-7367

ACTION CANADA

1-888-642-2725

LA FÉDÉRATION NATIONALE DE L'AVORTEMENT (NAF)

1-800-772-9100



SERVICES D'OPTIONS EN MATIÈRE DE GROSSESSE

1-888-875-3163



Ligne téléphonique gratuite offrant soutien et conseils.



Informations sur l'avortement, l'adoption et les ressources parentales.



Aide à l'accès à l'avortement à la fois près de chez soi et en cas de déplacement.



Scanner le formulaire de référence.



ACCÉDER À L'AVORTEMENT EN

COLOMBIE-BRITANNIQUE



Nous nous engageons à fournir un environnement sûr et solidaire pour vous aider à naviguer dans le réseau de soins de santé et à recevoir les soins dont vous avez besoin.





CONTRACEPTION EN

COLOMBIE- BRITANNIQUE

La Colombie-Britannique offre également une couverture universelle en matière de contraception à tous ceux qui possèdent une carte d'assurance maladie de la Colombie-Britannique.



AVORTEMENT PAR MÉDICAMENTS

- Les médicaments mifépristone et misoprostol provoquent une fausse couche à la maison.
- Sécuritaire, couramment utilisé et efficace.
- Disponible jusqu'à 9 à 10 semaines de grossesse.
- Peut être prescrit par des médecins et des infirmières praticiennes partout en Colombie-Britannique.
- Peut être disponible par télémédecine.
- Coût couvert par le régime d'assurance médicale de la Colombie-Britannique
- L'avortement par médicaments n'est PAS une contraception d'urgence.



AVORTEMENT PAR INSTRUMENTS

- La procédure est prodiguée par un médecin dans une clinique ou un hôpital.
- Disponible jusqu'à la 25e semaine de grossesse et au-delà.
- Sécuritaire, couramment utilisé et efficace.
- Tous les coûts sont entièrement couverts par le carte d'assurance maladie de la Colombie-Britannique.

LA PROCÉDURE

- Un médicament est disponible pour prévenir la douleur.
- Le médecin praticien insérera un mince tube au-delà de votre col et dans l'utérus.
- Un petit appareil portatif retirera les tissus de grossesse de l'utérus.
- La procédure devrait prendre environ 10 minutes.

